

## ภาคผนวก ก

### การวิเคราะห์เพิ่มเติม

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อต้องการทราบว่า การคบเพื่อนที่โชยหาหรือสิ่งเสพติดนั้นจะเป็นตัวแปรที่นำไปสู่การร่อนลงหรือการสูญเสียความรู้สึกผูกพันของบิตามารคาที่มีต่อเด็กวัยรุ่นหรือไม่ ก่อนที่จะเริ่มนำวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าว ควรได้ทราบลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ได้เก็บเพิ่มเติมนี้ในลักษณะบางส่วน ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิภาค แขนงการเรียน ฯลฯ ผู้วิจัยนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง

#### ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม. 4 - ม. 6) จำนวน 146 คน ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้พอจะสรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้

#### เพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง

การกระจายสัดส่วนทางเพศของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ เพศชาย 46.6 เปอร์เซ็นต์ และเพศหญิง 66.2 เปอร์เซ็นต์ สำหรับด้านอายุ ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุกระจายตั้งแต่ 14 - 19 ปี แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ 16 ปี (32.9 เปอร์เซ็นต์)

#### ภูมิภาค

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่งนี้มาจากโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จึงมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง คือ 57.5 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม รองลงมาก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาจากจังหวัดอื่น ๆ 28.8 เปอร์เซ็นต์

#### อุปการะเลี้ยงดู

โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิตามารคา คือ 78.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูเป็นบุคคลอื่น เช่น ป้า, น้า, พี่ นั้น มีอยู่เพียง 8.9 เปอร์เซ็นต์

### แผนการเรียน

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะมีแผนการเรียน คณิต - วิทยาศาสตร์ ซึ่งคิดเป็น 60.3 เปอร์เซ็นต์ ศิลป์ - ภาษา 14.4 เปอร์เซ็นต์ และศิลป์ - คณิต 25.3 เปอร์เซ็นต์

### ระดับชั้นการศึกษา

การกระจายสัดส่วนระดับชั้นทางการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 32.2 เปอร์เซ็นต์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 33.6 เปอร์เซ็นต์ และมัธยมศึกษาปีที่ 6 34.2 เปอร์เซ็นต์

### สถานภาพการสมรสของบิดามารดา

การกระจายสัดส่วนของสถานภาพการสมรสของบิดามารดาค่อนข้างมีลักษณะห่างกันมาก กล่าวคือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน คิดเป็น 76 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บิดามารดาแยกกันอยู่, ปัจจุบันบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เสียชีวิตแล้ว และบิดามารดาเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ คิดเป็น 12.3, 11 และ .7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ในลำดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติม ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น

ประการแรกควรทราบถึงจำนวนของเด็กวัยรุ่นที่โชยหรือสิ่งเสพติด เสียก่อนว่ามีจำนวนเท่าใด มากพอที่จะวิเคราะห์ต่อไปหรือไม่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28  
แสดงจำนวนเด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติด

ประเภทของยา หรือสิ่ง เสพติด	จำนวน เด็กวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับยาหรือสิ่ง เสพติด		รวม
	ไม่ เคยไชยา หรือสิ่ง เสพติด	เคยใช้/ไชยา หรือสิ่ง เสพติด	
บุหรี่	80.1 (117)	19.9 (29)	146 (100)
อัลกอฮอล์	70.5 (103)	29.5 (43)	146 (100)
กัญชา	93.8 (137)	6.2 (9)	146 (100)

จากตารางแสดงให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยไชยาหรือสิ่ง เสพติด (บุหรี่ อัลกอฮอล์ และกัญชา) มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม การแสดงผลในตารางดังกล่าว ยังไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ว่า การที่เด็กวัยรุ่นคบเพื่อนที่เสพยา เสพติดให้โทษแล้ว จะทำให้ความรู้สึกผูกพันของบิดามารดาอ่อนลงหรือสูญเสียไป ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปจึงต้องพิจารณาว่าในจำนวนเด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติดนั้น มีกี่รายที่บิดามารดาทราบว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับ การไชยาหรือสิ่ง เสพติด และเมื่อทราบแล้วคงพิจารณาไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและเด็กวัยรุ่น เหล่านี้ว่ามีจำนวนเท่าใดที่ความสัมพันธ์ดังกล่าว เปลี่ยนไปในทางที่แย่หรือเสื่อมลงและมีจำนวนเท่าใดที่คงเดิม โดยพิจารณาจากตารางที่ 29 และตารางที่ 30

— ตารางที่ 29

แสดงจำนวนเด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติดแล้วบิคามารคาทราม

ประเภทของยา หรือสิ่ง เสพติด	จำนวนเด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติด แล้วบิคามารคาทรามหรือไม่		รวม
	ทราม	ไม่ทราม	
บุหรี	6.05 (13)	19.75 (16)	35.8 (29)
อัลกอฮอล์	41.98 (34)	11.11 (9)	53.09(43)
กัญชา	1.23 (1)	9.88 (8)	11.11(9)
รวม	59.26 (48)	40.74 (33)	100 (81)

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ในจำนวนเด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติดทั้งหมดนั้น บิคามารคาทรามมี 59.26 % ในขณะที่จำนวนบิคามารคาทที่ไม่ทรามว่า เด็กวัยรุ่นไชยาหรือสิ่ง เสพติดนั้น มี 40.74 % ในกลุ่มของ เด็กวัยรุ่นที่ไชยาหรือสิ่ง เสพติดแล้วบิคามารคาทรานั้น จำนวนเด็กวัยรุ่นที่ดื่มอัลกอฮอล์ มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ บุหรี และกัญชา ตามลำดับ

ตารางที่ 30  
แสดงจำนวนของ เด็กวัยรุ่นที่ ไซยาหรือสิ่ง เสพติด และเมื่อ บิคามารคาทราบแล้ว  
ความสัมพันธ์ระหว่าง บิคามารคา กับ เด็กวัยรุ่น เป็นอย่างไร

ประเภทของยา หรือสิ่ง เสพติด	ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง บิคามารคา กับ เด็กวัยรุ่น		รวม
	คงเดิม	เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะ ที่แยลง / เสื่อมลง	
บุหรี่	25 (12)	2.09 (1)	27.09 (13)
อัลกอฮอล์	68.75 (33)	2.09 (1)	70.84 (34)
กัญชา	2.07 (1)	-	2.07 (1)
รวม	95.82 (46)	4.18 (2)	100 (48)

จากตาราง แสดงให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นที่ ไซยาหรือสิ่ง เสพติด (บุหรี่, อัลกอฮอล์, กัญชา) แล้ว บิคามารคาทราบนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง บิคามารคา กับ เด็กวัยรุ่นมีลักษณะคงเดิม มีถึง 95.82 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง บิคามารคา กับ เด็กวัยรุ่นมีลักษณะที่แยลง หรือ เสื่อมลง มีเพียง 4.18 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าน้อยมาก ดังนั้น เมื่อการที่ เด็กวัยรุ่น ไซยาหรือ สิ่ง เสพติดแล้ว บิคามารคาทราบ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง บิคามารคา กับ เด็กวัยรุ่น เสื่อมลงนั้น มีไม่ถึง 10 % การที่จะวิเคราะห์ต่อไปว่า เมื่อ เด็กคบกับ เพื่อนที่ ไซยาหรือสิ่ง เสพติดแล้ว ทำให้ ความรู้สึกผูกพันของ บิคามารคาที่มีต่อ เด็กวัยรุ่น อ่อนลงหรือสูญเสียลงไปในั้น จึงไม่สามารถกระทำ ก่อไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตาม แนวความคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น ก็เป็น แนวคิดสร้างสรรค์และ เป็นระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่าง สมบูรณ์ก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดทางทฤษฎีและเหตุผลในอันที่จะพยายามอธิบายการ ไซยาหรือสิ่ง เสพติดในวัยรุ่นให้มากขึ้นได้ใน วิธีหนึ่ง ซึ่งในการศึกษาวิจัยขั้นต่อไปสามารถที่จะนำแนวความคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในวิธีอื่นก่อให้เกิดประโยชน์ได้